

فهرست

درس‌نامه و پاسخ‌نامه

تست

- فصل اول: تابع ۸ ۱۴۱
- فصل دوم: مثلثات ۳۰ ۱۹۰
- فصل سوم: حد ۴۹ ۲۳۸
- فصل چهارم: مشتق ۶۶ ۲۷۸
- فصل پنجم: کاربرد مشتق ۸۳ ۳۲۰
- فصل ششم: الگو و دنباله ۹۹ ۳۶۰
- فصل هفتم: توان و عبارتهای جبری ۱۰۷ ۳۸۴
- فصل هشتم: قدرمطلق و جزء صحیح ۱۱۳ ۴۰۰
- فصل نهم: توابع نمایی و لگاریتمی ۱۱۸ ۴۱۴
- فصل دهم: معادله درجه ۲ و سهمی ۱۲۶ ۴۳۰
- فصل یازدهم: معادله و نامعادله ۱۳۳ ۴۵۰
- فصل دوازدهم: هندسه تحلیلی ۱۳۷ ۴۶۲
- پاسخ‌نامه کلیدی ۴۷۲

۵۸۲- حاصل $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 4x}{3x}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{3}{4}$ (۲) صفر (۳) $\frac{4}{3}$ (۴) وجود ندارد.

۵۸۳- حاصل $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 5x}{x \tan 3x}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{5}{3}$ (۲) $\frac{25}{3}$ (۳) $\frac{25}{9}$ (۴) وجود ندارد.

۵۸۴- حاصل $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x}$ کدام است؟

(برگرفته از کتاب درسی)

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) ۱ (۳) -۲ (۴) ۲

۵۸۵- حاصل $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x}$ ، کدام است؟

(تهری قارج ۹۰)

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) ۱ (۴) ۲

۵۸۶- حاصل $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{\sin 3x}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (۳) $-\frac{1}{3}$ (۴) $-\frac{\sqrt{2}}{3}$

صفحة درس نامه: ۲۵۵
صفحة پاسخ: ۲۵۵

رفع ابهام حد توابع مثلثاتی
با استفاده از تغییر متغیر

۵۸۷- حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{2x - \pi}$ کدام است؟

(برگرفته از کتاب درسی)

- (۱) $\frac{\pi}{2}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) صفر (۴) -۱

۵۸۸- حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{2x - \pi}{\sin 2x}$ کدام است؟

(برگرفته از کتاب درسی)

- (۱) ۱ (۲) -۱ (۳) ۳ (۴) -۳

۵۸۹- مقدار $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 + \sin x}{2 \cos x}$ کدام است؟

(برگرفته از کتاب درسی)

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) -۱ (۴) $\frac{1}{2}$

۵۹۰- حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan x}{\sin(x - \frac{\pi}{4})}$ کدام است؟

(تهری قارج ۸۷)

- (۱) -۲ (۲) -۱ (۳) ۱ (۴) ۲

۵۹۱- حاصل $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \cos 2x}{2x + \pi}$ کدام است؟

(برگرفته از کتاب درسی)

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) ۲ (۳) صفر (۴) $-\frac{3}{2}$

۵۹۲- مقدار $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a}$ کدام است؟

(برگرفته از کتاب درسی)





- (۱) $\cos a$ (۲) $-\cos a$ (۳) $-\sin a$ (۴) $\sin a$

۵۹۳- حاصل $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin^2 \pi x}{[x] + \cos \pi x}$ ، کدام است؟

(ریاضی قارج ۹۸)





- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) π (۴) 2π

(برگرفته از کتاب درسی)







۵۹۴- کدام یک از نمودارهای توابع زیر در $x=1$ پیوسته است؟

۵۹۵- کدام تابع در $x=1$ حد دارد ولی ناپیوسته است؟



(برگرفته از کتاب درسی)

۵۹۶- نمودار تابعی که در همسایگی $x=-1$ تعریف شده و در این نقطه فقط پیوستگی چپ داشته باشد، کدام است؟



(برگرفته از کتاب درسی)

۵۹۷- کدام یک از توابع زیر به ازای هر عدد حقیقی پیوسته نمی باشد؟

(۴) $y = \sin x$

(۳) $y = 3x^3 - x^2 + 1$

(۲) $y = \frac{2x-1}{|x|}$

(۱) $y = \sqrt{x+1}$

(ریاضی ۹۷)

۵۹۸- تعداد نقاط ناپیوسته نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \frac{3-\sqrt{x+4}}{1+\sqrt{x+1}} + \frac{1}{x+5}$ ، کدام است؟

(۴) ۳

(۳) ۲

(۲) ۱

(۱) صفر

(تجربی فارغ ۸۷)

۵۹۹- با کدام مجموعه مقادیر a ، تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+a} & x \geq -1 \\ x^2 + ax & x < -1 \end{cases}$ در $x=-1$ پیوسته است؟

(۴) \mathbb{R}

(۳) \emptyset

(۲) $\{1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2}\}$

(۱) $\{1, \sqrt{2}\}$

(تجربی فارغ ۹۷)

۶۰۰- اگر تابع $f(x) = \begin{cases} \sqrt{ax+3} & x < 1 \\ x^2 + ax & x \geq 1 \end{cases}$ در نقطه $x=1$ پیوسته باشد، $f(-\frac{3}{4})$ کدام است؟

(۴) $2/5$

(۳) $1/5$

(۲) $1/25$

(۱) $0/5$

(تجربی ۹۷)

۶۰۱- تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} ax + 2^{x-2} & x < 3 \\ \log_2(1+x) & x \geq 3 \end{cases}$ در نقطه $x=3$ پیوسته است. $f(2)$ کدام است؟

(۴) صفر

(۳) ۱

(۲) $-1/5$

(۱) -2

(تجربی فارغ ۹۰)

۶۰۲- تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} a \sin 2x & \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{3\pi}{4} \\ \cos(x + \frac{\pi}{4}) & \frac{3\pi}{4} \leq x < 2\pi \end{cases}$ ، در $x = \frac{3\pi}{4}$ پیوسته است. مقدار a کدام است؟

(۴) ۱

(۳) $-\frac{1}{2}$

(۲) صفر

(۱) -1

(برگرفته از کتاب درسی)

۶۰۳- $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x} & x < 1 \\ 0 & x = 1 \\ \cos \pi x & x > 1 \end{cases}$ کدام یک از شرایط زیر را در $x=1$ دارد؟

(۴) نه پیوستگی راست و نه پیوستگی چپ

(۳) پیوسته است.

(۲) فقط پیوستگی چپ

(۱) فقط پیوستگی راست

(برگرفته از کتاب درسی)

۶۰۴- مقدار k چه قدر باشد تا $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & x \neq 2 \\ k & x = 2 \end{cases}$ در $x=2$ پیوسته باشد؟

(۴) -1

(۳) ۲

(۲) ۱

(۱) صفر

۶۰۵- تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} |x^2 + x - 2| & x \neq 1 \\ a & x = 1 \end{cases}$ به ازای کدام مقدار a ، در $x = 1$ پیوسته است؟ (تهری ۹۰)

(۱) هر مقدار a (۲) -3 (۳) 3 (۴) هیچ مقدار a

۶۰۶- تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 - \sqrt{1-x}} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$ ، به ازای کدام مقدار a در نقطه $x = 0$ پیوسته است؟ (تهری ۹۶)

(۱) -2 (۲) -1 (۳) 1 (۴) 2

۶۰۷- تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x-\sqrt{x}} & x > 1 \\ ax - a + 2 & x \leq 1 \end{cases}$ به ازای کدام مقدار a در نقطه $x = 1$ پیوسته است؟ (تهری خارج ۹۶)

(۱) 1 (۲) 2 (۳) هر مقدار a (۴) هیچ مقدار a

۶۰۸- به ازای کدام مقدار a ، تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{a+x^2}{|x+2|} & x \neq -2 \\ a & x = -2 \end{cases}$ ، در نقطه $x = -2$ فقط از چپ پیوسته است؟ (تهری ۹۸)

(۱) -12 (۲) -6 (۳) 6 (۴) 12

۶۰۹- تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{2|x-2|} & x \neq 2 \\ 2 & x = 2 \end{cases}$ ، از نظر پیوستگی در $x = 2$ ، چگونه است؟ (تهری خارج ۹۸)

(۱) از چپ پیوسته
(۲) پیوسته
(۳) از چپ ناپیوسته و از راست ناپیوسته
(۴) از راست پیوسته

۶۱۰- تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x+1} & |x| > 1 \\ 2x & |x| \leq 1 \end{cases}$ از نظر پیوستگی در دو نقطه به طول های 1 و -1 چگونه است؟ (تهری ۸۸)

(۱) در -1 ناپیوسته، در 1 ناپیوسته (۲) در -1 ناپیوسته، در 1 پیوسته (۳) در -1 پیوسته، در 1 پیوسته (۴) در -1 پیوسته، در 1 ناپیوسته

۶۱۱- تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} & x > 0 \\ a \sin(x + \frac{\pi}{6}) & x \leq 0 \end{cases}$ به ازای کدام مقدار a ، در $x = 0$ پیوسته است؟ (تهری ۸۶)

(۱) 2 (۲) 4 (۳) هیچ مقدار a (۴) هر مقدار a

۶۱۲- به ازای کدام مقدار a تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x - \sqrt{\cos x}}{\sin^2 x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$ در نقطه $x = 0$ پیوسته است؟ (تهری ۹۵)

(۱) $-\frac{1}{4}$ (۲) $-\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) هیچ مقدار a

۱۲ پیوستگی در توابع شامل جزه صحیح

۶۱۳- تابع $y = [x]$ در $x = -2$ چگونه است؟ (۱) فقط از راست پیوسته است. (۲) فقط از چپ پیوسته است. (۳) حد دارد ولی ناپیوسته است. (۴) پیوسته است.

۶۱۴- تابع $y = [2x]$ در $x = \frac{1}{2}$ و $x = \frac{1}{3}$ به ترتیب چگونه است؟ (۱) پیوسته - ناپیوسته (۲) ناپیوسته - پیوسته (۳) پیوسته - پیوسته (۴) ناپیوسته - ناپیوسته

۶۱۵- تابع $y = [\sin x]$ در بازه $[0, 2\pi]$ در چند نقطه ناپیوسته است؟ (۱) 2 (۲) 3 (۳) 4 (۴) 5

۶۱۶- تابع $y = x^2[x] + 3x$ در $x = 0$ و در $x = 1$ است. (۱) پیوسته - پیوسته (۲) پیوسته - ناپیوسته (۳) ناپیوسته - پیوسته (۴) ناپیوسته - ناپیوسته

۶۱۷- تابع $y = [-x]$ در چند نقطه از مجموعه $\{\frac{1}{3}, 2, \sqrt{3}\}$ پیوستگی راست دارد؟ (۱) صفر (۲) 1 (۳) 2 (۴) 3

۶۵۸- مجانب قائم تابع $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + x - 6}$ کدام است؟

- (۱) $x = -2$ (۲) $x = -3$ (۳) $x = 2$ (۴) $x = 3$

۶۵۹- تعداد مجانب‌های قائم تابع $y = \frac{\sqrt{x-1}}{x^2 - 4x}$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۶۶۰- تعداد مجانب‌های قائم تابع $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 2x^2 - 3x}$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۶۶۱- تابع $f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{[x] + [-x]}$ دارای چند مجانب قائم است؟ ([] نماد جزء صحیح است.)

- (۱) بی‌شمار (۲) ۷ (۳) ۵ (۴) مجانب قائم ندارد.

۶۶۲- تابع $f(x) = \frac{x\sqrt{16-x^2}}{\sin x}$ چند مجانب قائم دارد؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر


۶۶۳- نمودار تابع با ضابطه $y = \frac{x+1}{x^2+x}$ در نزدیکی مجانب قائم آن به کدام صورت است؟

- (۱)  (۲)  (۳)  (۴) 


۶۶۴- نمودار تابع $y = \frac{-2x+1}{x^2-4x+4}$ در اطراف مجانب قائم خود چگونه است؟

- (۱)  (۲)  (۳)  (۴) 

۶۶۵- نمودار تابع $f(x) = \frac{2[x]-3}{x^2-4x+4}$ در اطراف مجانب قائم آن به کدام صورت است؟ ([] نماد جزء صحیح است.)

- (۱)  (۲)  (۳)  (۴) 

۶۶۶- نمودار تابع $y = \frac{1}{x+|x|}$ در مجاورت مجانب قائم خود چگونه است؟

- (۱)  (۲)  (۳)  (۴) 

۶۶۷- نمودار تابع $f(x) = \frac{x+2}{x^2+bx+4}$ در اطراف مجانب قائمش به صورت مقابل است. مقدار b کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ± 4 (۳) -4 (۴) ± 2

۶۶۸- اگر فاصله مقادیر تابع $f(x) = \frac{1}{x}$ تا محور x ها از $\frac{1}{100}$ کم تر شود، مقادیر x در کدام فاصله باید قرار گیرند؟

- (۱) $(\frac{1}{100}, \frac{1}{100})$ (۲) $(-\infty, -100) \cup (100, +\infty)$ (۳) $(100, +\infty)$ (۴) $(0, 100)$


۶۶۹- با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه نادرست است؟

(۱) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

(۲) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$


(۳) هیچ کدام

(۴) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$



(برگرفته از کتاب درسی)

(کانون فرهنگی آموزش ۹۹)



۶۷۰- با توجه به نمودار مقابل، کدام گزینه صحیح است؟

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty \quad (۲)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty \quad (۱)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \quad (۴)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \quad (۳)$$

۶۷۱- کدام گزینه در مورد تابع $f(x) = 0 / 5^x$ غلط است؟

- (۱) به هر میزان که بخواهیم می‌توانیم مقادیر تابع را بزرگ کنیم به شرط آن‌که x به اندازه کافی کوچک باشد.
 (۲) به هر میزان که بخواهیم می‌توانیم مقادیر تابع را به صفر نزدیک کنیم به شرط آن‌که به اندازه کافی بزرگ باشد.
 (۳) تابع در $+\infty$ حد دارد.
 (۴) تابع در $-\infty$ حد دارد.

۶۷۲- حاصل $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+2}{x-1} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2-3x}$ برابر کدام گزینه است؟

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

(برگرفته از کتاب درسی)

۶۷۳- حاصل $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - x^2 + 1}{x + x^5 + 3}$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) -۱ (۳) صفر (۴) $\frac{1}{3}$

(برگرفته از کتاب درسی)

۶۷۴- حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + 2x - 5x^5)$ کدام است؟

- (۱) -۵ (۲) -۳ (۳) $-\infty$ (۴) $+\infty$

(برگرفته از کتاب درسی)

۶۷۵- حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^5 - 2x^3 + 1}{2x^3 - 2x^5 + x + 4}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{4}{3}$ (۲) -۲ (۳) صفر (۴) $+\infty$

(برگرفته از کتاب درسی)

۶۷۶- حاصل $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5 - 2x^3 + 1}{2x^4 + x + 7}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{3}{2}$ (۲) $\frac{1}{7}$ (۳) $+\infty$ (۴) $-\infty$

۶۷۷- حاصل کدام یک از حدود زیر نامتناهی است؟

(۱) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x + 4}{7x^2 - 11x^2 - 6x}$ (۲) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x + 4}{x^3 + x - 8}$ (۳) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^4 + 5x^2}{2x^3 + 9}$ (۴) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{1}{x^2}}{\frac{4}{x} - 5}$

(برگرفته از کتاب درسی)

۶۷۸- حاصل کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

(۱) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-\frac{1}{2}x^3 + 7x^2 - 6)$ (۲) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x}{3 - x}$ (۳) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^5 - 6x^3 - x}{x^2 - 5x + 1}$ (۴) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{4}$

(تجربی فارغ ۹۸)

۶۷۹- اگر $f(x) = x - \sqrt{4x^2 + x}$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ کدام است؟

- (۱) -۲ (۲) -۱ (۳) ۲ (۴) ۳

(کانون فرهنگی آموزش ۹۹)

۶۸۰- تابع با ضابطه $f(x) = \frac{|3x-1| - |2x+1|}{|3-x| - 2x}$ مفروض است. اختلاف دو مقدار $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ از هم کدام است؟

- (۱) صفر (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) ۱ (۴) $\frac{4}{3}$

۶۸۱- حد تابع $y = \frac{\sqrt{-x+1} + \sqrt{x}}{\sqrt{-4x+1} + \sqrt{27x}}$ وقتی $x \rightarrow -\infty$ ، کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) صفر (۳) وجود ندارد (۴) $\frac{1}{2}$

۶۸۲- اگر $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^n + 3x - 1}{2x^3 - x + 5} = 4$ باشد، مقدار an کدام است؟

- (۱) ۱۱ (۲) ۱۶ (۳) ۲۰ (۴) ۲۴

(ریاضی ۸۴)

۶۸۳- اگر $f(x) = \frac{2x+5}{x^2-4x+3}$ و $g(x) = 2^x$ ، آن‌گاه $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(f(x))$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) $+\infty$ (۴) $\frac{1}{2}$

(ریاضی خارج ۸۶)

۶۸۴- اگر $f(x) = 2^{\frac{1}{x}}$ و $g(x) = \frac{2x-3}{x+1}$ ، آن گاه $\lim_{x \rightarrow 0^-} (g \circ f)(x)$ کدام است؟

- (۱) -۳ (۲) -۱ (۳) $\frac{3}{2}$ (۴) ۲

(ریاضی خارج ۹۰)

۶۸۵- اگر $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x^2 - 4|}{ax^2 - x + 2} = -1$ ، آن گاه حد راست این عبارت در نقطه $x = -2$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{4}{3}$ (۲) $-\frac{2}{3}$ (۳) $\frac{2}{3}$ (۴) $\frac{4}{3}$

(تبری خارج ۹۱)

۶۸۶- در تابع با ضابطه $f(x) = \frac{ax^n - 3x + 1}{3x^2 + x}$ اگر $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{2}{3}$ ، آن گاه $f(-1)$ کدام است؟

- (۱) -۲ (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) ۲ (۴) ۳

(تبری ۹۵)


۶۸۷- در تابع با ضابطه $f(x) = \frac{ax + \sqrt{4x^2 + 5}}{2x + 2}$ ، اگر $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{5}{4}$ باشد، آن گاه حد $f(x)$ وقتی $x \rightarrow -1$ کدام است؟

- (۱) $\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{5}{6}$ (۳) $\frac{3}{2}$ (۴) $\frac{5}{4}$

(ریاضی ۸۷)


۶۸۸- حاصل $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left[\frac{1}{x} \right]$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) $+\infty$ (۴) $-\infty$



۶۸۹- منحنی تابع $f(x)$ مطابق شکل مقابل است. اگر $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ ، آن گاه حاصل $\lim_{x \rightarrow (-L)^-} f(x)$ کدام است؟ (کانون فرهنگی آموزش ۹۸)

- (۱) ۱ (۲) -۱ (۳) $+\infty$ (۴) $-\infty$



۶۹۰- شکل مقابل نمودار تابع $f(x) = \frac{x^2 - 2x + a}{x^2 + bx + 1}$ را نمایش می دهد. حاصل $a + b$ کدام است؟ (کانون فرهنگی آموزش ۹۹)

- (۱) صفر (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) -۱

(کانون فرهنگی آموزش ۹۸)

۶۹۱- اگر $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ و $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f \circ g)(x)$ کدام است؟

- (۱) $-\infty$ (۲) $+\infty$ (۳) ۱ (۴) -۱

(تبری ۹۸)

۶۹۲- اگر $f(x) = 2x + \sqrt{4x^2 + x}$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) $-\frac{1}{2}$ (۳) $-\frac{1}{4}$ (۴) صفر

صفحه درس نامه: ۲۷۵
صفحه پاسخ: ۲۷۶

۱۷ مجانب افقی

(بزرگ فته از کتاب درسی)

۶۹۳- مجانب افقی تابع $y = \frac{2x^2 + 3x + 1}{3x^2 - 1}$ کدام است؟

- (۱) $y = -1$ (۲) $y = \frac{2}{3}$ (۳) $x = \frac{2}{3}$ (۴) مجانب افقی ندارد.

۶۹۴- اگر مجانب افقی تابع $y = \frac{2ax^2 + 3bx + 1}{4x - 5}$ به صورت $y = -6$ باشد، آن گاه مقدار $a + b$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) -۴ (۳) -۸ (۴) ۸

(بزرگ فته از کتاب درسی)

۶۹۵- تعداد مجانب های افقی و قائم نمودار تابع $y = \frac{x+2}{x^2-4}$ کدام است؟

- (۱) دو مجانب قائم - یک مجانب افقی (۲) یک مجانب قائم - یک مجانب افقی (۳) فقط دو مجانب قائم (۴) فقط دو مجانب افقی

حد: **درس نامه ۹**
رفع ابهام حتماً با استفاده از هم‌ارزی

این قسمت جزء درس کتابتان نیست اما چون خیلی کاربرد دارد به عنوان یک اشاره کوتاه هم که شده ضرر ندارد. هم‌ارزی یعنی در حد به جای یک تابع می‌توانیم تابع دیگری را قرار دهیم. حد این تابع دوم دقیقاً مساوی همان تابع قبلی است ولی در عین حال محاسبه حد را بسیار ساده می‌کند. این جا فقط در مورد سه هم‌ارزی مثلثاتی حرف می‌زنیم:

۱ $\sin x \sim x$ ۲ $\tan x \sim x$ ۳ $\cos^n x \sim 1 - n \frac{x^2}{2}$

تذکره اولاً علامت \sim یعنی هم‌ارز، ثانیاً در هر سه تابع وقتی می‌توانیم از هم‌ارزی استفاده کنیم که کمان جلوی تابع مثلثاتی به سمت صفر میل کند. حالا بیایید کاربردشان را در چند مثال ببینیم:

مثال ۱ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$

در $\sin 2x$ وقتی $x \rightarrow 0$ داریم $2x \rightarrow 0$ ، پس می‌توانیم به جای $\sin 2x$ هم‌ارزش یعنی $2x$ را در صورت کسر قرار دهیم:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2$$

مثال ۲ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x}$

با استفاده از هم‌ارزی ۳ که در بالا دیدیم وقتی $x \rightarrow 0$ ، $\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2}$ ، پس:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \frac{x^2}{2})}{(\frac{x^2}{2})^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{\frac{4x^4}{4}} = \frac{1}{4}$$

حواسمان هست که وقتی $\sin 2x \sim 2x$ پس $\sin^2 2x \sim (2x)^2$ یعنی توان سینوس به تابع هم‌ارزش منتقل می‌شود.

تست حاصل $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos x}$ کدام است؟

۱) $-\frac{1}{4}$ ۲) $\frac{1}{4}$ ۳) $-\frac{1}{4}$ ۴) $\frac{1}{4}$

پاسخ گزینه ۱ در هر سه کسینوس کمان به سمت صفر میل می‌کند پس در هر سه از هم‌ارزی $\cos^n x \sim 1 - n \frac{x^2}{2}$ استفاده می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - (\cos x)^{\frac{1}{2}}}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \frac{x^2}{2}) - (1 - \frac{1}{2} \times \frac{x^2}{2})}{1 - (1 - \frac{x^2}{2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{4}}{\frac{x^2}{2}} = -\frac{1}{2}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin x} = 0$

گزینه ۲

با توجه به هم‌ارزی $\sin x$ در اطراف $x = 0$ داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin x} = \frac{\sin 3x}{3x} = \frac{1}{3}$$

بنابراین:

$$= \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - (-\frac{\sqrt{2}}{2})}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2$$

گزینه ۴ با توجه به اتحاد چاق و لاغر داریم:

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \sin x}{1 + \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}} \frac{(1 + \sin x)}{(1 + \sin x)(1 - \sin x + \sin^2 x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 - \sin x + \sin^2 x} = \frac{1}{1 - (-1) + (-1)^2} = \frac{1}{3}$$

گزینه ۱

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{(1 - \tan x)^2} = \frac{0}{0}$

می‌دانیم $1 - \sin 2x = (\sin x - \cos x)^2$ ، بنابراین فرم کسر را به صورت زیر

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{(1 - \tan x)^2} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\sin x - \cos x)^2}{(1 - \tan x)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\sin x - \cos x)^2}{(1 - \frac{\sin x}{\cos x})^2} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\sin x - \cos x)^2}{(\frac{\cos x - \sin x}{\cos x})^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\sin x - \cos x)^2}{\cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos^2 x = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

تبدیل می‌کنیم:

$\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}} \frac{1 - \tan^2 x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} = \frac{0}{0}$


گزینه ۱

می‌دانیم $1 + \sin 2x = (\sin x + \cos x)^2$ ، بنابراین فرم کسر به صورت زیر خواهد

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}} \frac{1 - \tan^2 x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}} \frac{1 - \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}}{\sqrt{(\sin x + \cos x)^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}} \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \cdot |\sin x + \cos x|}$$

بود:



با توجه به دایره مثلثاتی:

در $\frac{3\pi}{4}$ اندازه $\sin x$ از اندازه $\cos x$ بیشتر می‌باشد، با توجه به محدوده زاویه، $\sin x$ مثبت و $\cos x$ منفی می‌باشد، بنابراین $\sin x + \cos x$ مقداری مثبت است، پس خودش از قدرمطلق بیرون می‌آید، پس در ادامه خواهیم داشت:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}} \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \cdot |\sin x + \cos x|} = \lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}} \frac{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)}{\cos^2 x \cdot \sin x + \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{\cos^2 x} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}}{(\frac{\sqrt{2}}{2})^2} = -\frac{\sqrt{2}}{\frac{1}{2}} = -2\sqrt{2}$$



در بعضی از حدهای مثلثاتی برای این که عامل صفرکننده را در صورت و مخرج ببینیم، مجبوریم تغییر متغیر بدهیم. در این حدها معمولاً اگر $x \rightarrow a$ ، عاملی شبیه $x - a$ (عامل صفرشونده) را برابر متغیر جدیدی مثل t فرض می‌کنیم و حد را بر حسب t می‌نویسیم. بعد از آن معمولاً با استفاده از اتحادهای مثلثاتی یا هم‌ارزی‌هایی که دیدیم حد را حل می‌کنیم.

تست حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{2 \cos x - 1}{\pi - 3x}$ کدام است؟

(۱) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۲) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۳) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۴) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

پاسخ گزینه «۴» وقتی $x \rightarrow \frac{\pi}{3}$ هم صورت کسر یعنی

$$2 \cos x - 1 = 2\left(\frac{1}{2}\right) - 1 = 0 \quad \text{و هم مخرج کسر یعنی } \pi - 3x = \pi - 3\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$$

صفر می‌شوند. عامل $x - \frac{\pi}{3}$ را برابر t قرار می‌دهیم و x را بر حسب t پیدا می‌کنیم

و حواسمان هست که وقتی $t = x - \frac{\pi}{3}$ است به ازای $x \rightarrow \frac{\pi}{3}$ داریم $t \rightarrow 0$:

$$x - \frac{\pi}{3} = t \Rightarrow x = t + \frac{\pi}{3}, \quad x \rightarrow \frac{\pi}{3} \Rightarrow t \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{2 \cos x - 1}{\pi - 3x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \cos\left(t + \frac{\pi}{3}\right) - 1}{\pi - 3\left(t + \frac{\pi}{3}\right)}$$

حالا $\cos\left(t + \frac{\pi}{3}\right)$ را با استفاده از فرمول $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ بسط می‌دهیم:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2\left(\cos t \cos \frac{\pi}{3} - \sin t \sin \frac{\pi}{3}\right) - 1}{-3t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - \sqrt{3} \sin t - 1}{-3t}$$

حالا اگر از هم‌ارزی‌های $\cos t \sim 1 - \frac{t^2}{2}$ و $\sin t \sim t$ استفاده کنیم:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - \sqrt{3} \sin t - 1}{-3t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{t^2}{2} - \sqrt{3}t - 1}{-3t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t\left(-\frac{1}{2}t - \sqrt{3}\right)}{-3t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}t - \sqrt{3}}{-3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

۵۸۷ گزینه ۳ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{2x - \pi} = 0$

با تغییر متغیر $t = x - \frac{\pi}{2}$ داریم: $x = t + \frac{\pi}{2}$ و همچنین می‌دانیم t به سمت صفر

میل می‌کند، بنابراین: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{2x - \pi} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - 1}{2\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - \pi} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{2t}$

حالا با توجه به هم‌ارزی مقابل: $\cos t \sim 1 - \frac{t^2}{2}$ ($t \rightarrow 0$)

فرم کسر به صورت زیر خواهد بود:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{t^2}{2} - 1}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{t^2}{2}}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} -\frac{t}{4} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\sin x|}{x} = 0$$

با توجه به این که $\sin x$ در اطراف $x = 0^-$ منفی می‌باشد، بنابراین $|\sin x| = -\sin x$ است. پس فرم کسر به صورت زیر خواهد بود:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x}{x}$$

از طرفی با توجه به هم‌ارزی $\sin x \sim x$ در اطراف $x = 0$ خواهیم داشت:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 4x}{3x} = 0$$

با توجه به هم‌ارزی $\tan x \sim x$ در اطراف $x = 0$ داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 4x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{3x} = \frac{4}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \Delta x}{x \tan 3x} = 0$$

با توجه به هم‌ارزی‌های زیر در اطراف $x = 0$ داریم:

$$\sin \Delta x \sim \Delta x, \quad \tan 3x \sim 3x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \Delta x}{x \tan 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2}{x(3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{25x^2}{3x^2} = \frac{25}{3}$$

بنابراین:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} = 0$$

$$\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2} \quad \text{و} \quad x \rightarrow 0$$

با توجه به هم‌ارزی

فرم کسر به صورت زیر خواهد بود:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{x^2}{2}} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x} = 0$$

با توجه به هم‌ارزی‌های روبه‌رو: $\cos 2x \sim 1 - \frac{(2x)^2}{2}$ ($x \rightarrow 0$)

فرم کسر به صورت زیر خواهد بود:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{(2x)^2}{2}\right)}{x \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x)^2}{x^2} = \frac{4x^2}{x^2} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{\sin 3x} = 0$$

با توجه به هم‌ارزی‌های روبه‌رو: $\sin 3x \sim 3x$ ($x \rightarrow 0$)

فرم کسر به صورت زیر خواهد بود:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - \left(1 - \frac{(2x)^2}{2}\right)}}{3x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - 1 + \frac{4x^2}{2}}}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{2x^2}}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{2}|x|}{3x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sqrt{2}x}{3x} = -\frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3x - \pi}{\sin 3x} = \frac{0}{0}$$

با تغییر متغیر $t = x - \frac{\pi}{3}$ داریم: $x = t + \frac{\pi}{3}$ و می‌دانیم t به سمت 0 میل می‌کند

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3x - \pi}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3(t + \frac{\pi}{3}) - \pi}{\sin(3(t + \frac{\pi}{3}))} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3t}{\sin(3t + \pi)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3t}{-\sin 3t}$$

$$\sin 3t \sim 3t \quad (t \rightarrow 0)$$

با توجه به هم‌ارزی مقابل:

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3t}{-\sin 3t} = \frac{3t}{-3t} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin x}{\sqrt{\cos x}} = \frac{0}{0}$$

با تغییر متغیر $t = x - \frac{\pi}{2}$ داریم: $x = t + \frac{\pi}{2}$ و می‌دانیم t به سمت 0 میل می‌کند، بنابراین:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin x}{\sqrt{\cos x}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 + \sin(t + \frac{\pi}{2})}{\sqrt{\cos(t + \frac{\pi}{2})}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{\sqrt{\sin t}}$$

با توجه به هم‌ارزی $\sin t$ و $\cos t$ در اطراف $t = 0$ داریم:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \frac{t^2}{2})}{\sqrt{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{t^2}{2}}{\sqrt{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{2\sqrt{t}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan x}{\sin(x - \frac{\pi}{4})} = \frac{0}{0}$$

با تغییر متغیر $t = x - \frac{\pi}{4}$ داریم: $x = t + \frac{\pi}{4}$ و می‌دانیم t به سمت 0 میل می‌کند، بنابراین:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan x}{\sin(x - \frac{\pi}{4})} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan(t + \frac{\pi}{4})}{\sin(t + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4})} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \tan(t + \frac{\pi}{4})}{\sin t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \tan t - \tan \frac{\pi}{4}}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \tan t - 1}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\tan t}{\sin t}$$

با توجه به هم‌ارزی $\tan t$ و $\sin t$ در اطراف $t = 0$ خواهیم داشت:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\tan t}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t}{t} = -1$$

بنابراین فرم کسر به صورت زیر خواهد بود:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\tan t}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} -1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2x}{2x + \pi} = \frac{0}{0}$$

با تغییر متغیر $t = x + \frac{\pi}{2}$ داریم: $x = t - \frac{\pi}{2}$ و می‌دانیم t به سمت 0 میل می‌کند،

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2x}{2x + \pi} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 + \cos(2t - \pi)}{2(t - \frac{\pi}{2}) + \pi} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2t}{2t}$$

بنابراین: با توجه به هم‌ارزی $\cos t$ در اطراف $t = 0$ داریم:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2t}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \frac{(2t)^2}{2})}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t^2}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} t = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a} = \frac{0}{0}$$

با تغییر متغیر $t = x - a$ داریم: $x = t + a$ و می‌دانیم $t \rightarrow 0$ میل می‌کند،

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos(t + a) - \cos a}{t + a - a}$$

بنابراین:

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos(t + a) - \cos a}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\cos t \cos a - \sin t \sin a - \cos a)}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\cos t \cos a - \cos a}{t} - \frac{\sin t \sin a}{t} \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\cos a (\cos t - 1)}{t} - \frac{\sin t \sin a}{t} \right)$$

با توجه به هم‌ارزی $\sin t$ و $\cos t$ اطراف $t = 0$ داریم:

$$\sin t \sim t, \quad \cos t \sim 1 - \frac{t^2}{2}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\cos a (1 - \frac{t^2}{2} - 1)}{t} - \frac{t \sin a}{t} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(-\frac{t}{2} \cos a - \sin a \right)$$

$$= -\sin a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin^2 \pi x}{[x] + \cos \pi x} = \frac{0}{0}$$

روش اول

ابتدا تکلیف جزء صحیح را در اطراف 1^+ تعیین می‌کنیم:

$$x \rightarrow 1^+ : [x] = [1^+] = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin^2 \pi x}{[x] + \cos \pi x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \cos^2 \pi x}{1 + \cos \pi x}$$

بنابراین:

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(1 - \cos \pi x)(1 + \cos \pi x)}{1 + \cos \pi x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1 - \cos \pi x$$

$$= 1 - \cos \pi = 1 - (-1) = 2$$

روش دوم: ابتدا به جای $[x]$ عدد یک را قرار می‌دهیم، سپس با تغییر متغیر

$$x - 1 = t, \quad x = t + 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin^2 \pi x}{[x] + \cos \pi x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2(\pi t + \pi)}{1 + \cos(\pi t + \pi)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 \pi t}{1 - \cos \pi t}$$

با توجه به هم‌ارزی‌ها می‌توانیم بنویسیم:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi^2 t^2}{1 - (1 - \frac{\pi^2 t^2}{2})} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi^2 t^2}{\frac{\pi^2 t^2}{2}} = 2$$

۲ از نظر ریاضی تابع وقتی در نقطه $x = a$ پیوسته است که:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

یعنی تابع باید هم از چپ و هم از راست پیوسته باشد.

تست اگر تابع $f(x) = \begin{cases} \sin \sqrt{x} & x > \frac{\pi}{2} \\ a + \sin x & x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$ در نقطه $x = \frac{\pi}{2}$ پیوسته

باشد، $f(0)$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) -۱

پاسخ گزینه «۲» باز هم مقدار، حد راست و حد چپ تابع را پیدا می‌کنیم:

$$\left. \begin{aligned} \text{مقدار و حد چپ: } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (a + \sin x) &= a + 1 \\ \text{حد راست: } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin \sqrt{x}}{\cos x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{x} \sin x \cos x}{\cos x} \Rightarrow a + 1 = 2 \Rightarrow a = 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sqrt{x} \sin x = 2 \end{aligned} \right\}$$

حالا با مقدار $a = 1$ مقدار $f(0)$ را به دست می‌آوریم: $f(0) = 1 + \sin 0 = 1$

۳ پیوستگی‌های یک‌طرفه (راست و چپ ناپیوستگی محسوب می‌شوند.

۴ توابع چندجمله‌ای، یعنی:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x^1 + a_0$$

در تمام نقاط \mathbb{R} پیوسته‌اند. (چون موقع پیدا کردن حد تابع همان کاری را می‌کنیم که موقع پیدا کردن مقدار تابع انجام می‌دهیم.)

۵ توابع سینوس و کسینوس (به شرطی که زیر رادیکال نباشند یا کسری نباشند یا جلوی لگاریتم نباشند و ...) در تمام نقاط \mathbb{R} پیوسته‌اند.

۶ توابع کسری (گویا) در ریشه‌های مخرجشان ناپیوسته‌اند (چون در این نقاط تعریف نشده‌اند).

۷ توابع رادیکالی با فرجه زوج در دامنه تعریفشان پیوسته‌اند. یعنی تابع $y = \sqrt[n]{f(x)}$ در نقاط بازه‌هایی که $f(x) > 0$ باشد، پیوسته است.

۸ در توابع رادیکالی با فرجه فرد، رادیکال تأثیری در پیوستگی ندارد، یعنی بازه پیوستگی تابع $y = \sqrt[n]{f(x)}$ همان بازه پیوستگی تابع $f(x)$ است.

تست کدام یک از توابع زیر در تمام نقاط \mathbb{R} پیوسته‌اند؟

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 1} \quad (2) & f(x) &= \frac{x^2 - 2x}{x} \quad (1) \\ f(x) &= \sqrt{x - \frac{1}{x}} \quad (4) & f(x) &= \frac{\sqrt{x+1}}{x^2 + 4} \quad (3) \end{aligned}$$

پاسخ گزینه «۳» تک تک گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم.


۱: تابع $y = \frac{x^2 - 2x}{x}$ در ریشه مخرجش یعنی $x = 0$ ناپیوسته است.

حواسمان باشد حق نداریم قبل از تعیین وضعیت پیوستگی تابع ضابطه را به شکل

$$f(x) = \frac{x(x-2)}{x} = x-2$$


حد: پیوستگی تابع در یک نقطه

درس‌نامه ۱۱




در شکل‌های مقابل مقدار و حد تابع را در نقطه a بررسی می‌کنیم:


شکل ۱: مقدار حد راست و حد چپ تابع با هم برابرند. این تابع در نقطه $x = a$ پیوسته است.




شکل ۲: تابع حد دارد ولی حد تابع با مقدارش برابر نیست. این تابع در نقطه $x = a$ ناپیوسته است.




شکل ۳: تابع حد ندارد و مقدار تابع نیز نه با حد راست برابر است و نه با حد چپ، این تابع در نقطه $x = a$ نه از راست پیوسته است و نه از چپ.



شکل ۴: تابع حد ندارد. مقدار تابع با حد چپ آن برابر است. این تابع در نقطه $x = a$ پیوستگی چپ دارد اما ناپیوسته است.



شکل ۵: تابع حد ندارد. مقدار تابع با حد راست آن برابر است. این تابع در نقطه $x = a$ پیوستگی راست دارد اما ناپیوسته است.







شکل ۶: تابع حد ندارد. حد راست و چپ نامتناهی‌اند و تابع در نقطه $x = a$ تعریف نشده. این تابع در نقطه $x = a$ ناپیوسته است.

حالا با توجه به مطالب بالا می‌توانیم بگوییم:

۱ از نظر شهودی (از روی شکل) تابع وقتی در یک نقطه پیوسته است که دو شاخه راست و چپ نمودار در آن نقطه به هم برسند و آن نقطه توپر باشد؛ یعنی مقدار تابع نیز در همان نقطه تعریف شده باشد.

تست کدام تابع در نقطه $x = a$ حد دارد ولی پیوسته نیست؟



پاسخ گزینه «۳» طبق مطالب بالا جواب گزینه (۳) می‌شود.

گزینه ۲ ۵۹۷

- ۱: در درس نامه گفتیم توابع رادیکالی با فرجه فرد تأثیری در پیوستگی عبارت ندارند و پیوستگی به عبارت زیر رادیکال بستگی دارد که در این جا یک چندجمله‌ای است. پس به ازای هر عدد حقیقی پیوسته است.
- ۲: در تقسیم چندجمله‌ای‌ها بر یکدیگر نقاطی که در آن‌ها مخرج صفر می‌شوند، نقاط ناپیوستگی هستند. پس در $x = 0$ ناپیوسته است.
- ۳: گفتیم چندجمله‌ای‌ها به ازای هر عدد حقیقی پیوسته‌اند.
- ۴: توابع مثلثاتی $\cos x$ و $\sin x$ همواره پیوسته هستند.

گزینه ۲ ۵۹۸

$$f(x) = \frac{3 - \sqrt{x+4}}{1 + \sqrt{x+1}} + \frac{1}{x+5}$$

توابع حاصل از تقسیم و یا جمع چند تابع چندجمله‌ای و یا توابع رادیکالی در دامنه خود پیوسته‌اند، پس ابتدا دامنه تابع را پیدا می‌کنیم.

$$\sqrt{x+4} \Rightarrow x+4 \geq 0 \Rightarrow x \geq -4 \quad (I)$$

$$1 + \sqrt{x+1} \neq 0 \Rightarrow \sqrt{x+1} \neq -1 \Rightarrow x+1 \neq -1$$

$$\Rightarrow x \neq -2 \quad (II)$$

$$x+5 \neq 0 \Rightarrow x \neq -5 \quad (III)$$

از اشتراک ۳ رابطه داریم: $D_f = (I) \cap (II) \cap (III) = [-4, +\infty) - \{-2\}$

پس تابع در نقطه -2 ($-2 \notin D_f$) و -4 (تابع در همسایگی آن تعریف نشده است) پیوسته نیست.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = f(-1)$$

گزینه ۲ ۵۹۹

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \left(\frac{1}{x+a} \right) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} (x^2 + ax) = \frac{1}{-1+a}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{-1+a} = (-1)^2 + a \times (-1) \Rightarrow \frac{1}{-1+a} = 1 - a$$

$$\Rightarrow (1-a)(-1+a) = 1 \Rightarrow -(1-a)^2 = 1$$

$$\Rightarrow (1-a)^2 = -1 \Rightarrow \text{معادله جواب ندارد.} \Rightarrow a \in \{ \}$$

گزینه ۲ ۶۰۰

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{ax+3} & x < 1 \\ x^2 + ax & x \geq 1 \end{cases}$$

ابتدا شرط پیوستگی را در $x = 1$ می‌نویسیم:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + ax) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{ax+3}) = 1+a$$

$$\Rightarrow 1+a = \sqrt{a+3} \xrightarrow[\text{توان ۲ می‌رسانیم}]{\text{دو طرف را به}} 1+2a+a^2 = a+3$$

$$\Rightarrow a^2 + a - 2 = 0 \Rightarrow (a+2)(a-1) = 0 \Rightarrow a = -2 \text{ یا } a = 1$$

حال با جای‌گذاری a می‌بینیم به ازای کدام مقدار، تابع $f(x)$ پیوسته است.

$$a = -2:$$

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-2x+3} & x < 1 \\ x^2 - 2x & x \geq 1 \end{cases} \Rightarrow D_f: -2x+3 \geq 0 \Rightarrow x \leq \frac{3}{2}$$

$$f\left(-\frac{3}{4}\right) = \sqrt{-2 \times \left(-\frac{3}{4}\right) + 3} = \sqrt{4/5}$$

۲: تابع $y = \frac{\sqrt{x}}{x^2+1}$ در مخرجش مشکلی ندارد. چون مخرج ریشه ندارد اما در صورت کسر به علت وجود \sqrt{x} تابع در بازه $[0, +\infty)$ پیوسته است.


۳: تابع $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x^2+4}$ در \mathbb{R} پیوسته است چون در صورت کسر که \sqrt{x} تأثیری در بازه پیوستگی ندارد و مخرج کسر هم که ریشه ندارد پس تابع در \mathbb{R} پیوسته است.

۴: $f(x) = \sqrt{x - \frac{1}{x}}$ در ریشه مخرج کسر $\frac{1}{x}$ یعنی در $x = 0$ ناپیوسته است.

۹: برای بررسی پیوستگی یک تابع در صورتی که بتوانیم نمودارش را رسم کنیم، می‌توانیم از همین دید شهودی استفاده کنیم.

تست تابع $f(x) = \cos x$ در بازه $[0, 2\pi]$ در چند نقطه ناپیوسته است؟

- (۱) دو (۲) سه (۳) صفر (۴) یک



گزینه «۱» اول نمودار تابع

$y = \cos x$ را رسم می‌کنیم.

با توجه به شکل تابع در نقاط 2π و $x = 0$ ناپیوسته است.

گزینه ۳ ۵۹۴

می‌دانیم شرط پیوستگی یک تابع این است که حد چپ و راست آن با یکدیگر برابر باشند و مقدار تابع با حد آن برابر باشد.

۱: در این گزینه حد چپ و راست تابع در نقطه $x = 1$ با یکدیگر برابر نیستند، پس تابع حد ندارد و پیوسته نیست.

۲: تابع در این گزینه حدی برابر با ۲ دارد. (حد راست و چپ موجود و برابرند) ولی مقدار تابع با حد آن در نقطه $x = 1$ برابر نیست.

۳: حد چپ و حد راست موجود و برابرند و با مقدار تابع در نقطه $x = 1$ برابر است. پس پیوسته است.

۴: در نقطه $x = 1$ تابع به بی‌نهایت میل می‌کند و حد ندارد. پس پیوسته نیست.

گزینه ۱ ۵۹۵

۱: در این گزینه در $x = 1$ حد راست با حد چپ برابر است. ولی نقطه $x = 1$ در دامنه آن تعریف نشده است. ($1 \notin D_f$) پس در این نقطه تعریف نشده است و پیوسته نیست.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$$

حد ندارد. $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0, \quad f(1) = 0$$

تابع در $x = 1$ پیوسته است.

۴: طبق شکل تابع فقط در همسایگی چپ $x = 1$ تعریف شده پس حد ندارد.

گزینه ۴ ۵۹۶

۱: این تابع در همسایگی راست $x = -1$ تعریف نشده است.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = 0, \quad f(-1) = 1 \Rightarrow \text{پیوستگی چپ ندارد.}$$

۳: این تابع در $x = -1$ تعریف نشده است، پس پیوستگی ندارد.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = 1, \quad f(-1) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = f(-1)$$

پس پیوستگی چپ دارد.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} \right) = k \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} \right) = \frac{0}{0} \text{ (میهم)}$$

پس باید رفع ابهام کنیم.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{(x-2)(x-1)}{(x-2)} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} (x-1)$$

$$= 2 - 1 = 1 \Rightarrow f(2) = 1$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2 + x - 2|}{x - 1} & x \neq 1 \\ a & x = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 + x - 2|}{x - 1} = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 + x - 2|}{x - 1} = \frac{0}{0} \text{ (میهم)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 + x - 2|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x - 1| |x + 2|}{x - 1}$$

$$x \rightarrow 1^+ \xrightarrow{x-1 > 0} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{|x - 1| |x + 2|}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} |x + 2| = 3$$

$$x \rightarrow 1^- \xrightarrow{x-1 < 0} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{|x - 1| |x + 2|}{x - 1} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} (-|x + 2|) = -3$$

وجود ندارد و $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

پس این تابع به ازای هیچ مقدار a در $x = 1$ پیوسته نیست.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 - \sqrt{1-x}} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{1 - \sqrt{1-x}} \right) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{1 - \sqrt{1-x}} \right) = \frac{0}{0} \text{ (میهم)}$$

$$\text{رفع ابهام: } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{1 - \sqrt{1-x}} \times \frac{1 + \sqrt{1-x}}{1 + \sqrt{1-x}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x(1 + \sqrt{1-x})}{1 - (1-x)} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x(1 + \sqrt{1-x})}{x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sqrt{1-x}) = 1 + \sqrt{1+0} = 2 \Rightarrow a = 2$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x-\sqrt{x}} & x > 1 \\ ax - a + 2 & x \leq 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a - a + 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x-1}{x-\sqrt{x}} \right) = \frac{0}{0} \text{ (میهم)}$$

$$\text{رفع ابهام: } \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x-1}{x-\sqrt{x}} \times \frac{x+\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}} \right)$$

گزینه ۴ ۶۰۵

$a = 1$: بازه داده شده برای این ضابطه با دامنه همخوانی دارد.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+3} & x < 1 \\ x^2 + x & x \geq 1 \end{cases}$$

$$D_f : x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$$

پس بازه ضابطه اول باید به شکل $x \geq -3$ تغییر کند.

$$f\left(-\frac{3}{4}\right) = \sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right) + 3} = \sqrt{\frac{9}{4}} = 1/5$$

$$f(x) = \begin{cases} ax + 2^{x-2} & x < 2 \\ a \log_2(1+x) & x \geq 2 \end{cases}$$

گزینه ۲ ۶۰۱

شرط پیوستگی تابع در $x = 2$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} (a \log_2(1+x)) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (ax + 2^{x-2})$$

$$\Rightarrow a \log_2(1+2) = (a \times 2 + 2^0) \Rightarrow a \log_2 2^2 = 2a + 1$$

$$\Rightarrow a \times 2 \times \log_2 2 = 2a + 1 \Rightarrow 2a = 2a + 1 \Rightarrow a = -1$$

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2^{x-2} & x < 2 \\ -\log_2(1+x) & x \geq 2 \end{cases}$$

$$f(2) = -2 + 2^{2-2} = -2 + 2^{-1} = -2 + \frac{1}{2} = -1/5$$

$$f(x) = \begin{cases} a \sin 2x & \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{3\pi}{4} \\ \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) & \frac{3\pi}{4} \leq x < 2\pi \end{cases}$$

گزینه ۲ ۶۰۲

پیوستگی تابع را در نقطه مرزی $x = \frac{3\pi}{4}$ بررسی می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}^-} f(x) = f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}^-} (a \sin 2x) = \lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}^+} \left(\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right)$$

$$\Rightarrow a \sin\left(2 \times \frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$a \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \cos(\pi) \Rightarrow a \times (-1) = (-1) \Rightarrow a = 1$$

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x} & x < 1 \\ 0 & x = 1 \\ \cos \pi x & x > 1 \end{cases}$$

گزینه ۲ ۶۰۳

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (\sqrt{1-x}) = \sqrt{1-1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\cos \pi x) = \cos \pi = -1$$

وجود ندارد و $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

پس تابع پیوسته نیست.

$$f(1) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \Rightarrow$$

تابع فقط پیوستگی چپ دارد.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & x \neq 2 \\ k & x = 2 \end{cases}$$

گزینه ۲ ۶۰۴

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

$$= \lim_{x \rightarrow (-1)^-} (x-1) = -1-1 = -2$$

$$f(-1) = -2$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow (-1)} f(x) = f(-1) \Rightarrow$ در این نقطه پیوسته است

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} & x > 0 \\ a \sin(x + \frac{\pi}{6}) & x \leq 0 \end{cases}$$

گزینه ۲ ۶۱۱

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \quad \text{شرط پیوستگی در نقطه } x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (a \sin(x + \frac{\pi}{6})) = a \sin \frac{\pi}{6} = \frac{a}{2} = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\frac{x^2}{\frac{x^2}{2}}) = 2 \Rightarrow \frac{a}{2} = 2 \Rightarrow a = 4$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x - \sqrt{\cos x}}{\sin^2 x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$$

گزینه ۱ ۶۱۲

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \quad \text{شرط پیوستگی در نقطه } x = 0$$

$$f(0) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\cos x - \sqrt{\cos x}}{\sin^2 x}) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1 - \frac{x^2}{2} - (1 - \frac{1}{2} \times \frac{x^2}{2})}{x^2})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1 - \frac{x^2}{2} - 1 + \frac{x^2}{4}}{x^2}) = \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{2}}{x^2}) = \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1 - 1}{4}) = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow a = -\frac{1}{4}$$

حد:

درس نامه ۱۲

پیوستگی در توابع شامل جزء صحیح

قبلاً دیدیم که در تابع جزء صحیح هم مثل همه تابع‌های دیگر برای بررسی پیوستگی باید حد راست، حد چپ و مقدار تابع را به دست آوریم و با هم مقایسه کنیم.

تست اگر تابع $f(x) = \frac{[x] + a}{[2x] + 1}$ در نقطه $x = 1$ پیوسته باشد، مقدار a کدام است؟

- ۱) ۲
- ۲) ۳
- ۳) ۴
- ۴) جواب ندارد.

پاسخ گزینه «۳» باید مقدار، حد راست و حد چپ تابع را در $x = 1$ پیدا کنیم. اگر حواسمان باشد می‌بینیم که مقدار و حد راست $[x]$ و $[2x]$ در $x = 1$

برابرند، پس: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{[x] + a}{[2x] + 1} = \frac{1 + a}{2 + 1} = \frac{a + 1}{3} = f(1)$

حد چپ: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{[x] + a}{[2x] + 1} = \frac{0 + a}{1 + 1} = \frac{a}{2}$

پس باید $\frac{a + 1}{3} = \frac{a}{2}$ باشد: $2a + 2 = 3a \Rightarrow a = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (\frac{(x-1)(x+\sqrt{x})}{x^2 - (\sqrt{x})^2}) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\frac{(x-1)(x+\sqrt{x})}{x^2 - x})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} (\frac{(x-1)(x+\sqrt{x})}{x(x-1)}) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\frac{x+\sqrt{x}}{x}) = \frac{1+\sqrt{1}}{1} = 2$$

پس مقدار a هر عددی می‌تواند باشد.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda + x^2}{|x + 2|} & x \neq -2 \\ a & x = -2 \end{cases}$$

گزینه ۲ ۶۰۸

برای پیوستگی از چپ داریم:

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) = f(-2) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (-2)^-} (\frac{\lambda + x^2}{-(x+2)}) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} (\frac{\lambda + x^2}{-(x+2)}) = \frac{0}{0} \text{ مبهم}$$

رفع ابهام: $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} (\frac{\lambda + x^2}{-(x+2)})$

$$= \lim_{x \rightarrow (-2)^-} (\frac{(x+2)(x^2 - 2x + 4)}{-(x+2)}) = \lim_{x \rightarrow (-2)^-} (-(x^2 - 2x + 4))$$

$$= -((-2)^2 - 2 \times (-2) + 4) = -12 \Rightarrow a = -12$$

گزینه ۴ ۶۰۹

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{2|x - 2|} & x \neq 2 \\ 2 & x = 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (\frac{x^2 - 4}{2|x - 2|}) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (\frac{(x-2)(x+2)}{2|x - 2|})$$

$$\xrightarrow{x-2 < 0} \lim_{x \rightarrow 2^-} (\frac{(x-2)(x+2)}{-2(x-2)}) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (\frac{x+2}{-2}) = \frac{2+2}{-2} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (\frac{x^2 - 4}{2|x - 2|}) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (\frac{(x-2)(x+2)}{2|x - 2|})$$

$$\xrightarrow{x-2 > 0} \lim_{x \rightarrow 2^+} (\frac{x+2}{2}) = \frac{2+2}{2} = 2$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \Rightarrow$ حد ندارد پس پیوسته نیست.

از راست پیوسته است. $f(2) = 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) \Rightarrow$

گزینه ۴ ۶۱۰

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x + 1} & x > 1 \cup x < -1 \\ 2x & -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (\frac{x^2 - 1}{x + 1}) = (\frac{1^2 - 1}{1 + 1}) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x) = 2 \times 1 = 2 \end{aligned} \right\} \text{ در نقطه } x = 1 \text{ داریم:}$$


$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Rightarrow$ تابع حد ندارد در این نقطه پیوسته نیست.

در نقطه $x = -1$ داریم: $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} (2x) = 2 \times (-1) = -2$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} (\frac{x^2 - 1}{x + 1}) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} (\frac{(x-1)(x+1)}{x+1})$$

گزینه ۱

با توجه به دایره مثلثاتی:



$$\Rightarrow \begin{cases} \cos \frac{\pi}{2} = 0^- \\ \sin \frac{\pi}{2} = 1^- \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+} \tan 2x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+} \frac{\sin 2x}{\cos 2x} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}^+}{\cos \frac{\pi}{2}^+} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

گزینه ۴

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\tan x}{\cot x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\frac{\sin x}{\cos x}}{\frac{\cos x}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

گزینه ۴

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3 - 3 \cos x}{x^2}$$

$$\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2}$$

با توجه به هم‌ارزی \cos اطراف ۰ داریم:

بنابراین فرم کسر به صورت زیر خواهد بود:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3 - 3 \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3 - 3(1 - \frac{x^2}{2})}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3x^2}{2x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{2} = \frac{3}{2} = +\infty$$

گزینه ۲

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x + \sin^2 2x}{3x^2}$$

$$\sin 2x \sim 2x$$

با توجه به هم‌ارزی \sin اطراف ۰ داریم:

بنابراین فرم کسر به صورت زیر خواهد بود:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x + \sin^2(2x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x + (2x)^2}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x + 4x^2}{3x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 + 4x}{3x} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

گزینه ۱

$$f(x) = \frac{\sin x}{1 + 2 \cos x}$$

تمام گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱ و ۲:


$$\lim_{x \rightarrow \frac{2\pi}{3}^+} \frac{\sin x}{1 + 2 \cos x} = \frac{\sin \frac{2\pi}{3}^+}{1 + 2 \cos \frac{2\pi}{3}^+} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 + 2 \cdot \frac{-1}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{0^-} = -\infty \checkmark$$

همان‌طور که در دایره مثلثاتی مشخص است با

افزایش مقدار زاویه از $\frac{2\pi}{3}$ (یعنی مقدار \cos)

کم‌تر از $-\frac{1}{2}$ است.

۳:



$$\lim_{x \rightarrow \frac{2\pi}{3}^-} \frac{\sin x}{1 + 2 \cos x} = \frac{\sin \frac{2\pi}{3}^-}{1 + 2 \cos \frac{2\pi}{3}^-} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 + 2 \cdot \frac{-1}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{0^+} = +\infty \times$$





$$\lim_{x \rightarrow \frac{4\pi}{3}} \frac{\sin x}{1 + 2 \cos x}$$

۴:

$$\begin{cases} 1 + 2 \cos \frac{4\pi}{3}^+ = 0^+ \Rightarrow \frac{-\sqrt{3}}{0^+} = -\infty \\ 1 + 2 \cos \frac{4\pi}{3}^- = 0^- \Rightarrow \frac{-\sqrt{3}}{0^-} = +\infty \end{cases}$$

فصلنامه درس‌نامه ۱۵ مجانبات قائم

به نمودار تابع‌های زیر نگاه کنیم:



نمودارهای هر چهار تابع در اطراف نقطه $x = 2$ به سمت $+\infty$ یا $-\infty$ میل

می‌کنند. در هر چهار نمودار به خط $x = 2$ مجانب قائم می‌گوییم یعنی:

اگر در تابع $f(x)$ وقتی $x \rightarrow a$ (از راست یا چپ یا هر دو سمت حد تابع

یعنی حد $f(x)$ به سمت $+\infty$ یا $-\infty$ میل کند می‌گوییم خط $x = a$

مجانبات قائم تابع است.

روش پیدا کردن مجانب قائم در توابع مختلف

۱ برای پیدا کردن مجانب قائم توابع کسری باید ریشه‌های مخرج تابع را

پیدا کنیم.

پس از پیدا کردن ریشه‌های مخرج حتماً باید ریشه مخرج را در صورت قرار


دهیم و حد صورت را هم پیدا کنیم. در نتیجه:

$$\text{قراردادن ریشه مخرج در صورت} \Rightarrow \begin{cases} \text{ریشه مخرج مجانب قائم است.} \Rightarrow \text{صورت} \neq 0 \\ \text{صورت} \neq 0 \Rightarrow \text{حاصل} \neq \pm\infty \\ \text{صورت} = 0 \Rightarrow \text{رفع ابهام} \Rightarrow \text{صورت} = 0 \\ \text{صورت} = 0 \Rightarrow \text{ریشه مخرج مجانب قائم نیست.} \\ \text{صورت} = 0 \Rightarrow \text{حاصل} = \pm\infty \\ \text{صورت} = 0 \Rightarrow \text{ریشه مخرج مجانب قائم است.} \end{cases}$$


۴ معادله خطوط مجانب قائم تابع $y = \tan x$ به صورت $y = \log_c(ax + b)$ و معادله خط مجانب قائم تابع $x = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$ به صورت $x = \frac{-b}{a}$ است. (یعنی همان ریشه‌های مخرج)

رسم نمودار تابع در اطراف مجانب قائم

برای پیدا کردن وضعیت نمودار یک تابع در اطراف مجانب قائم کافی است حد راست و حد چپ تابع را در اطراف مجانب قائم پیدا کنیم.



۴ وضعیت منحنی $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x^2 - 3x + 2}$ در اطراف مجانب قائمش کدام است؟



گزینه «۴» اول ریشه‌های مخرج را پیدا می‌کنیم:

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \xrightarrow{a+b+c=0} x = 1, x = 2$$

$x = 1$ قابل قبول نیست چون $\sqrt{x-2}$ به ازای $x = 1$ تعریف نشده است. حالا حد راست و حد چپ تابع را وقتی $x \rightarrow 2$ به دست می‌آوریم:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{x-2}}{(x-1)(x-2)} =$$

وجود ندارد چون رادیکال در همسایگی چپ ۲ تعریف نشده است.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x-2}}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x-1)\sqrt{x-2}} = \frac{1}{1 \times 0^+} = +\infty$$

پس وضعیت منحنی در اطراف مجانب قائمش به صورت است.

۶۵۸ گزینه ۲

$$y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + x - 6}$$

ابتدا ریشه‌های مخرج را به دست می‌آوریم.

$$x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow (x+3)(x-2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \checkmark \text{ (ریشه صورت نیست)} \\ x = 2 \end{cases}$$

۳ تست تابع $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x}$ چند مجانب قائم دارد؟

- هیچ (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴)

۳ گزینه «۳» ریشه‌های مخرج را پیدا می‌کنیم و در صورت امتحان می‌کنیم:

$$x^2 - x = 0 \Rightarrow x(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 1, x = -1$$

مجانب قائم $x = 0 \Rightarrow -2 \neq 0 \Rightarrow x = 0$ صورت

مجانب قائم $x = -1 \Rightarrow -2 \neq 0 \Rightarrow x = -1$ صورت

$$x = 1 \Rightarrow \text{صورت} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x(x+1)} = \frac{3}{2}$$

مجانب قائم نیست.

پس تابع دو خط مجانب قائم دارد $x = 0$ و $x = -1$.

۲ اگر تابع کسری شامل عواملی باشد که دامنه تابع را محدود کند (مثل رادیکال، لگاریتم و ...) ریشه مخرج به دست آمده برای مجانب قائم به شرطی قابل قبول است که تابع حداقل در یک همسایگی راست یا چپ آن ریشه تعریف شده باشد.

۳ تست تابع $f(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{x^2 - 2x - 3}$ چند خط مجانب قائم دارد؟

- هیچ (۱) یک (۲) دو (۳) بی‌شمار (۴)

۲ گزینه «۲» اول ریشه‌های مخرج را پیدا می‌کنیم:

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \xrightarrow{a+c=b} x = -1, x = 3$$

حالا $\sqrt{x-3}$ در همسایگی $x = -1$ تعریف نشده است $(\sqrt{-1-3})$ ، پس

$x = -1$ مجانب قائم نیست، اما $\sqrt{x-3}$ در همسایگی راست $x = 3$ تعریف

شده پس $x = 3$ مجانب قائم است پس تابع یک خط مجانب قائم دارد. (البته

صورت کسر هم به ازای $x = 3$ برابر صفر است که بعد از رفع ابهام حاصل حد $+\infty$ می‌شود.)

۳ اگر مخرج به علت وجود جزء صحیح صفر شود؛ یعنی ریشه‌های مخرج از حل یک معادله شامل براکت، به دست آیند، باید حواسمان باشد در صورتی که حد مخرج به ازای میل کردن x به سمت ریشه آن، خود عدد صفر باشد، باز هم تابع در همسایگی ریشه تعریف نشده است و ریشه به دست آمده مجانب قائم نیست.

۳ تست تابع $f(x) = \frac{1}{(x^2 - 4)([x]^2 - 1)}$ چند مجانب قائم دارد؟

- هیچ (۱) دو (۲) چهار (۳) بی‌شمار (۴)

۲ گزینه «۲» اگر مخرج را برابر صفر قرار دهیم:

$$x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = 2, x = -2$$

$$[x]^2 - 1 = 0 \Rightarrow [x]^2 = 1 \Rightarrow [x] = 1, [x] = -1$$

ریشه‌های $[x] = 1$ و $[x] = -1$ مجانب قائم نیستند زیرا به ازای آن‌ها حد مخرج

صفر نمی‌شود بلکه مخرج برابر خود عدد صفر می‌شود پس تابع فقط دو مجانب قائم

دارد $x = -2$ و $x = 2$.

چون $x = 2$ ریشه مشترک با صورت است، نیاز به رفع ابهام دارد:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + x - 6} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-1)}{(x-2)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-1}{x+3} = \frac{1}{5}$$

بنابراین $x = 2$ مجانب قائم نیست.

پس $x = -3$ تنها مجانب قائم تابع می‌باشد.

۶۵۹ گزینه ۲

$$y = \frac{\sqrt{x-1}}{x^2 - 4x}$$

ابتدا ریشه‌های مخرج را محاسبه می‌کنیم: $x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x(x-4) = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \quad (0 \notin D_f) \\ x = 4 \end{cases}$$

بنابراین $x = 2$ تنها مجانب قائم است.

۶۶۰ گزینه ۲

$$y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 2x^2 - 3x}$$

ابتدا ریشه‌های مخرج را به دست می‌آوریم:

$$x^2 - 2x^2 - 3x = x(x^2 - 2x - 3) = x(x-3)(x+1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \quad \checkmark \text{ (ریشه مشترک با صورت نیست)} \\ x = -1 \quad \checkmark \text{ (ریشه مشترک با صورت نیست)} \\ x = 3 \quad \Rightarrow \text{ نیاز به بررسی دارد (ریشه مشترک با صورت)} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 2x^2 - 3x} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-1)}{x(x-3)(x+1)} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

بنابراین $x = 3$ مجانب قائم نیست.

پس $x = 0$ و $x = -1$ مجانب‌های قائم تابع هستند.

۶۶۱ گزینه ۴

$$f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{[x]+[-x]}$$

$$[x]+[-x] = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{Z} \\ -1 & x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

به ضابطه تابع $y = [x]+[-x]$ توجه کنید:

با توجه به ضابطه $y = [x]+[-x]$ مقدار تابع در تمام نقاط صحیح برابر صفر می‌باشد.

ولی دقت کنید در همسایگی این نقاط مخرج \circ نخواهد بود، بنابراین به عنوان

مجانب قائم قابل قبول نیستند. پس تابع هیچ مجانب قائمی ندارد. (مثلاً $x = 2$)

ریشه مخرج می‌باشد، ولی در 2^+ و 2^- این مقدار -1 می‌باشد.

۶۶۲ گزینه ۲

$$f(x) = \frac{x\sqrt{16-x^2}}{\sin x}$$

با توجه به $\sqrt{16-x^2}$ داریم:

$$16 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 16 \xrightarrow{\text{جذر}} |x| \leq 4 \Rightarrow -4 \leq x \leq 4$$

بنابراین بایستی، آن دسته از ریشه‌های مخرج را بررسی کنیم که در بازه $[-4, 4]$

باشد. می‌دانیم مقدار $\sin x$ در π و 0 و $-\pi$ در این بازه برابر صفر می‌باشد.

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \pi \Rightarrow \checkmark \text{ (ریشه مشترک با صورت نیست)} \\ x = 0 \Rightarrow \text{ نیاز به بررسی دارد} \Rightarrow \text{ریشه مشترک با صورت} \\ x = -\pi \Rightarrow \checkmark \text{ (ریشه مشترک با صورت نیست)} \end{cases}$$

حل حد تابع را در $x = 0$ بررسی می‌کنیم: (با توجه به هم‌ارزی $\sin x$ در اطراف \circ

داریم: $\sin x \sim x$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{16-x^2}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{16-x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{16-x^2} = 4$$

بنابراین $x = 0$ به عنوان مجانب قائم قابل قبول نیست.

پس $x = \pi$ و $x = -\pi$ مجانب‌های قائم تابع هستند.

۶۶۳ گزینه ۳

$$y = \frac{x+1}{x^2+x} \Rightarrow x^2+x=0 \Rightarrow x(x+1)=0 \Rightarrow x=0$$

ابتدا حد تابع را در سمت راست و چپ مجانب تابع (یعنی $x = 0$) به دست می‌آوریم.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x^2+x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x(x+1)} = \frac{1}{0^+ \times 1} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+1}{x^2+x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+1}{x(x+1)} = \frac{1}{0^- \times 1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

بنابراین رفتار تابع در اطراف $x = 0$ به صورت روبه‌رو است:



۶۶۴ گزینه ۱

$$y = \frac{-2x+1}{x^2-4x+4} = \frac{-2x+1}{(x-2)^2} \Rightarrow (x-2)^2=0 \Rightarrow x=2$$

ابتدا حد راست و چپ تابع را در اطراف $x = 2$ به دست آوریم:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-2x+1}{(x-2)^2} = \frac{-3}{(0^+)^2} = \frac{-3}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-2x+1}{(x-2)^2} = \frac{-3}{(0^-)^2} = \frac{-3}{0^+} = -\infty$$

بنابراین رفتار تابع در اطراف $x = 2$ به صورت روبه‌رو است:



۶۶۵ گزینه ۱

$$f(x) = \frac{\sqrt{[x]-3}}{x^2-4x+4} = \frac{\sqrt{[x]-3}}{(x-2)^2} \Rightarrow (x-2)^2=0 \Rightarrow x=2$$

ابتدا حد راست و چپ تابع را در $x = 2$ به دست می‌آوریم:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{[x]-3}}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{[x^+]-3}}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x-2)^2} = \frac{1}{(0^+)^2}$$

$$= \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{[x]-3}}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{[x^-]-3}}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-1}{(x-2)^2} = \frac{-1}{(0^-)^2}$$

$$= \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

بنابراین رفتار تابع در اطراف $x = 2$ به صورت روبه‌رو است:



۶۶۶ گزینه ۱

$$y = \frac{1}{x+|x|}$$

دقت کنید تابع در همسایگی چپ $x = 0$ تعریف نشده است، زیرا مخرج صفر مطلق

$$x+|x| = x-x = 0$$

می‌باشد.

پس حد در بی‌نهایت را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

به معنی آن است که	به شرط آن که	حد
می‌توانیم $f(x)$ را هر اندازه که بخواهیم به عدد L نزدیک کنیم.	x را به اندازه کافی بزرگ در نظر بگیریم.	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$
می‌توانیم $f(x)$ را هر اندازه که بخواهیم به عدد L نزدیک کنیم.	x را به اندازه کافی کوچک در نظر بگیریم.	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$

برای پیدا کردن حد تابع‌ها وقتی $x \rightarrow \pm\infty$ از نکات زیر استفاده می‌کنیم:

۱ حد $\frac{\text{عدد}}{\pm\infty}$ برابر صفر است. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{x^n} = 0, (n > 0)$

۲ حد هر چند جمله‌ای وقتی که $x \rightarrow \pm\infty$ برابر جمله شامل بزرگ‌ترین توان x است. (پرتوان)

تست حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x+1} + \frac{2x+1}{3x-2}$ برابر کدام است؟

(۱) صفر $\frac{2}{3} (2) \frac{2}{3} (3) 2 (4) \frac{1}{3}$

پاسخ گزینه «۲» حد کسر $\frac{2}{x+1}$ که به شکل $\frac{\text{عدد}}{\infty}$ است برابر صفر است و

در مورد کسر دوم داریم: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x+1} + \frac{2x+1}{3x-2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 0 + \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$

تست حاصل $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x - 5}{x^2 - x - 2}$ کدام است؟

(۱) صفر (۲) ۲ (۳) ۵ (۴) $+\infty$

پاسخ گزینه «۲» قرار شد در صورت و مخرج جمله پرتوان را در نظر بگیریم:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x - 5}{x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2$

تست اگر حاصل $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^n + x^2 - x + 5}{3x^2 + 2x - 1} = 2$ باشد، $a + n$ کدام است؟

(۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۷

پاسخ گزینه «۴» در صورت کسر یا باید ax^n جمله پرتوان باشد و یا x^2 .

اگر ax^n پرتوان باشد و $x > 3$ آن‌گاه: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^n}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a}{3} x^{n-2} = \infty$

پس n نمی‌تواند بزرگ‌تر از ۲ باشد، اگر هم n کوچک‌تر از ۲ باشد آن‌وقت حاصل

حد برابر است با: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$

که برابر ۲ نیست. پس n باید حتماً برابر $n = 2$ باشد. با این حساب جمله پرتوان صورت برابر است با $ax^2 + x^2 = (a+1)x^2$ و حاصل حد برابر است با:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(a+1)x^2}{3x^2} = \frac{a+1}{3}$

پس $\frac{a+1}{3} = 2$ و در نتیجه $a+1 = 6$ و $a = 5$ پس حاصل $a+n$ برابر است با $5+2=7$.

۳ اگر در عبارت رادیکال داشته باشیم، عامل زیر رادیکال هم مثل یک

عامل با توان کسری با بقیه عامل‌ها مقایسه می‌شود؛ مثلاً در $\sqrt{x^2 + x - 1}$

ولی در همسایگی راست $x = 0$ داریم:

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x + |x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x + x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

بنابراین در همسایگی چپ $x = 0$ تعریف نشده است و در همسایگی راست آن $+\infty$ می‌باشد.

گزینه ۳ ۶۶۷

$f(x) = \frac{x+2}{x^2 + bx + 4}$

با توجه به این‌که تابع در همسایگی راست و چپ (ریشه مخرج) مجانب قائم $+\infty$ می‌باشد، بنابراین بایستی در اطراف ریشه مخرج تغییر علامت نداشته باشیم، پس بایستی ریشه مضاعف باشد.

$\Delta_{\text{مخرج}} = 0 \Rightarrow b^2 - 4(1)(4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} b = 4 \\ \text{یا} \\ b = -4 \end{cases}$

اگر $b = 4$ باشد، $f(x) = \frac{x+2}{x^2 + 4x + 4}$ می‌باشد و در اطراف مجانب قائم به صورت زیر است:

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)}{(x+2)^2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{(x+2)}$ $\begin{cases} \xrightarrow{(-2)^+} \frac{1}{0^+} = +\infty \\ \xrightarrow{(-2)^-} \frac{1}{0^-} = -\infty \end{cases}$


بنابراین با توجه به مقایسه به دست آمده رفتار تابع در اطراف مجانب به صورت روبه‌رو است: پس $b = 4$ قابل قبول نیست.

اگر $b = -4$ باشد، $f(x) = \frac{x+2}{x^2 - 4x + 4}$ می‌باشد و در اطراف مجانب قائم به صورت زیر است:

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{(x-2)^2} = \frac{4}{0^+} = +\infty$

پس رفتار تابع در اطراف مجانب به صورت روبه‌رو است:

حد در بی‌نهایت درس‌نامه ۱۶



به نمودار تابع $f(x) = \frac{1}{x}$ نگاه کنیم:

در این تابع وقتی مقادیر x بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند، مقدار تابع به صفر نزدیک می‌شود این موضوع را به این صورت نشان می‌دهیم:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

و منظورمان این است که می‌توانیم مقدار تابع f را هر اندازه که بخواهیم به عدد صفر نزدیک کنیم به شرط آن که x را به اندازه کافی بزرگ در نظر بگیریم.

و همین‌طور وقتی x خیلی کوچک می‌شود (در جهت منفی) باز هم مقادیر

$f(x)$ به صفر نزدیک می‌شود؛ یعنی: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

۵ بعضی وقتها حد عبارت وقتی که $x \rightarrow \pm\infty$ به شکل $\infty - \infty$ تبدیل می‌شود. اگرچه این نوع رفع ابهام مستقیماً جزء درس کتاب نیست اما چون راه‌حلش مشابه رفع ابهام $\frac{0}{0}$ است بهتر است یک بار با هم ببینیم. برای رفع ابهام این عبارتها، عبارت را در مزدوجش ضرب و تقسیم می‌کنیم. عبارت به شکل $\frac{\infty}{\infty}$ تبدیل می‌شود که آن را با توجه به روش‌های قبل رفع ابهام می‌کنیم.

تست حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + 1 - \sqrt{4x^2 - 8x + 20}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) -۱ ۳) ۲ ۴) ۳

پاسخ گزینه «۴» اگر بزرگ‌ترین توان‌ها را در نظر بگیریم می‌شود، $2x - 2x$ یعنی حالت مبهم $\infty - \infty$ داریم. عبارت را در مزدوجش ضرب و تقسیم می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + 1 - \sqrt{4x^2 - 8x + 20}) \times \frac{2x + 1 + \sqrt{4x^2 - 8x + 20}}{2x + 1 + \sqrt{4x^2 - 8x + 20}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x + 1)^2 - (4x^2 - 8x + 20)}{2x + 1 + \sqrt{4x^2 - 8x + 20}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 4x + 1 - 4x^2 + 8x - 20}{2x + (2x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12x - 19}{4x} = 3$$

۶ گاهی اوقات هم همین حالت $\infty - \infty$ را در تفاضل دو کسر داریم. این‌جا هم راه‌حل خیلی راحت است، کافی است مخرج مشترک بگیریم. حالت مبهم معمولاً تبدیل به $\frac{0}{0}$ می‌شود که آن را با تجزیه رفع ابهام می‌کنیم.

تست حاصل حد $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} - \frac{4}{x^2-4}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) $\frac{1}{4}$ ۳) $\frac{1}{2}$ ۴) $\frac{1}{8}$

پاسخ گزینه «۳» وقتی $x \rightarrow 2$ حد هر دو کسر ∞ می‌شود؛ یعنی با $\infty - \infty$ سروکار داریم، مخرج مشترک می‌گیریم:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} - \frac{4}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2-4}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}$$

۶۶۸ گزینه ۲

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

با توجه به این که محور x همان $y = 0$ می‌باشد، بایستی داشته باشیم:

$$|f(x) - 0| < \frac{1}{100} \Rightarrow \left| \frac{1}{x} \right| < \frac{1}{100} \Rightarrow \frac{1}{|x|} < \frac{1}{100}$$

$$\Rightarrow 100 < |x| \Rightarrow x > 100 \text{ یا } x < -100$$

$$(-\infty, -100) \cup (100, +\infty)$$

۶۶۹ گزینه ۴ تمام گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم: (با توجه به نمودار)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \checkmark$: ۱

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \checkmark$: ۲

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \checkmark$: ۳

بنابراین همه گزینه‌ها صحیح هستند.

جمله $x^{\frac{1}{2}} = x$ است یا در $\sqrt[3]{2x^2 + 3x - 2}$ جمله پرتوان $(2x^2)^{\frac{1}{3}}$ است. در این حالت باز هم باید جمله پرتوان را در نظر بگیریم. فقط نکته مهم آن است که اگر عاملی را از زیر رادیکال با توان زوج خارج کنیم، باید حتماً داخل قدرمطلق قرار گیرد و بعد از این که علامت داخل قدرمطلق را مشخص کردیم، قدرمطلق را حذف می‌کنیم.

تست حاصل $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + \sqrt{x^2 + 2}}{3x - \sqrt{4x^2 - 1}}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) $\frac{2}{3}$ ۳) $\frac{1}{5}$ ۴) ۳

پاسخ گزینه «۳» در صورت کسر توان جمله $2x$ برابر است با ۱ و توان جمله $\sqrt{x^2 + 1}$ هم برابر است با $\frac{2}{3}$. پس در صورت باید هر دو را در نظر بگیریم. در مخرج هم توان $3x$ برابر ۱ و توان $\sqrt{4x^2 - 1}$ هم برابر $\frac{2}{3}$ است، پس در مخرج هم باید هر دو را در نظر بگیریم:


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + \sqrt{x^2 + 2}}{3x - \sqrt{4x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + |x|}{3x - |2x|}$$

مهم آن است که وقتی x^2 و $4x^2$ را از زیر رادیکال بیرون می‌آوریم، داخل قدرمطلق قرار دهیم. حالا چون x و $2x$ در داخل قدرمطلق منفی‌اند:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + |x|}{3x - |2x|} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - x}{3x + 2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{5x} = \frac{1}{5}$$

۴ اگر نمودار تابع را داشته باشیم، برای تعیین حد تابع وقتی $x \rightarrow +\infty$ یا وقتی $x \rightarrow -\infty$ باید ببینیم در اول و آخر نمودار (در امتداد محور x) عرض نقاط روی منحنی به کدام عدد نزدیک می‌شود.

تست اگر نمودار تابع $f(x) = \frac{ax + |x|}{bx - 1}$ به صورت شکل زیر باشد،



$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ برابر کدام است؟

۱) صفر ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) ۱ ۴) $\frac{3}{2}$

پاسخ گزینه «۳» در شکل دو نکته داریم. اولاً $x = 1$ مجانب قائم نمودار است، پس $x = 1$ باید ریشه مخرج کسر باشد:

$$x = 1 \Rightarrow b(1) - 1 = 0 \Rightarrow b = 1$$

و ثانیاً وقتی $x \rightarrow +\infty$ ، حد تابع برابر ۳ است:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax + |x|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(a+1)x}{x} = a + 1 \Rightarrow a + 1 = 3 \Rightarrow a = 2$$

پس ضابطه $f(x)$ برابر است با $f(x) = \frac{2x + |x|}{x - 1}$ ، حالا $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ را پیدا

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + |x|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x} = 1$$

می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\Delta x + 4}{x^2 + x - 8} = \frac{\Delta x}{x^2} = \frac{\Delta}{x^2} = \frac{\Delta}{+\infty} = 0 \quad \times$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^2 + \Delta x^2}{2x^2 + 9} = \frac{-4x^2}{2x^2} = -2x^{\frac{2}{2}} = -2(-\infty)^{\frac{2}{2}} = -2(-\infty)^1 = -2(-\infty) = +\infty \quad \checkmark$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{1}{x^2}}{\frac{4}{x} - \frac{1}{\infty}} = \frac{3 + \frac{1}{\infty}}{\frac{4}{\infty} - \frac{1}{\infty}} = \frac{3}{-\infty} \quad \times$$

گزینه ۴ ۶۷۸

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-\frac{1}{2}x^2 + 7x^2 - 6) = -\frac{1}{2}x^2 = -\frac{1}{2}(\infty)^2 = -\infty \quad : 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x}{3 - x} = \frac{x^2}{-x} = -x = -\infty \quad : 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^5 - 6x^2 - x}{x^2 - 5x + 1} = \frac{2x^5}{x^2} = 2x^3 = 2(-\infty)^3 = -\infty \quad : 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{4} = \frac{2x}{4} = \frac{x}{2} = \frac{\infty}{2} = \infty \quad : 4$$

بنابراین حاصل گزینه $+\infty$ می‌باشد، در صورتی که سایر گزینه‌ها $-\infty$ است.

گزینه ۴ ۶۷۹

$$f(x) = x - \sqrt{4x^2 + x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \sqrt{4x^2 + x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - |2x|}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{x} = 3$$

گزینه ۴ ۶۸۰

$$f(x) = \frac{|3x - 1| - |2x + 1|}{|3 - x| - 2x}$$

حاصل هر دو حد را محاسبه می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|3x - 1| - |2x + 1|}{|3 - x| - 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3x - 1) - (2x + 1)}{-(3 - x) - 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 2}{-x - 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{-x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|3x - 1| - |2x + 1|}{|3 - x| - 2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-(3x - 1) - (-(2x + 1))}{(3 - x) - 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-(3x - 1) + (2x + 1)}{3 - 3x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{3 - 3x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{-3x} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} - (-1) = \frac{4}{3}$$

بنابراین اختلاف دو مقدار به دست آمده برابر است با:

گزینه ۴ ۶۸۱

$$y = \frac{\sqrt{-x+1} + \sqrt[3]{x}}{\sqrt{-4x+1} + \sqrt[3]{27x}}$$

بایستی در صورت و مخرج جملات با بزرگترین توان را بنویسیم:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{-x+1} + \sqrt[3]{x}}{\sqrt{-4x+1} + \sqrt[3]{27x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{-x+1}}{\sqrt{-4x+1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{-x}}{\sqrt{-4x}}$$

$$= \frac{\sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}} = \frac{1}{2}$$

گزینه ۴ ۶۷۰ تمام گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم: (با توجه به نمودار)

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \Rightarrow \begin{cases} (-1)^+ : -\infty \\ (-1)^- : +\infty \end{cases} \quad \times \quad : 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \Rightarrow \begin{cases} 1^+ : +\infty \\ 1^- : +\infty \end{cases} \quad \times \quad : 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \quad \times \quad : 3$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \quad \checkmark \quad : 4$$

گزینه ۴ ۶۷۱ تک تک گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱: بدین معنی است که با میل کردن x به سمت $-\infty$ ، حاصل تابع $+\infty$ است. حال درستی آن را بررسی می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e/5)^x = (\frac{1}{5})^{-\infty} = 5^{+\infty} = +\infty \quad \checkmark$$

۲: بدین معنی است که با میل کردن x به سمت $+\infty$ حاصل تابع 0 است. حال

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e/5)^x = (\frac{1}{5})^{+\infty} = 0 \quad \checkmark$$

درستی آن را بررسی می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e/5)^x = (\frac{1}{5})^{+\infty} = 0 \quad \checkmark \quad : 3$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e/5)^x = (\frac{1}{5})^{-\infty} = 5^{+\infty} = \infty \quad \times \quad : 4$$

گزینه ۲ ۶۷۲ با توجه به این که در $x \rightarrow \pm\infty$ می‌توان صورت و مخرج

را معادل با جمله با بزرگترین توان در نظر گرفت:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x + 2}{x - 1} = \frac{3x}{x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2 - 3x} = \frac{1}{-3x} = \frac{1}{-\infty} = 0$$

بنابراین حاصل عبارت خواسته شده برابر است با:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x + 2}{x - 1} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2 - 3x} = 3 + 0 = 3$$

گزینه ۲ ۶۷۳ با استفاده از جمله با بیشترین توان داریم:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - x^2 + 1}{x + x^5 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2}{x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x} = \frac{-1}{-\infty} = 0$$

گزینه ۲ ۶۷۴ با استفاده از جمله با بیشترین توان داریم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + 2x - 5x^5) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^5 = -5(+\infty) = -\infty$$

گزینه ۲ ۶۷۵ استفاده از جمله با بیشترین توان داریم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^5 - 2x^2 + 1}{3x^3 - 2x^5 + x + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^5}{-2x^5} = -2$$

گزینه ۴ ۶۷۶ با استفاده از جمله با بیشترین توان داریم:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5 - 2x^3 + 1}{2x^4 + x + 7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5}{2x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{2} = \frac{3(-\infty)}{2} = -\infty$$

گزینه ۳ ۶۷۷ حاصل حد هر یک از گزینه‌ها را به دست می‌آوریم: (با توجه

به این که باید از جمله با بزرگترین توان استفاده کنیم)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x + 4}{7x^2 - 11x^2 - 6x} = \frac{2x^3}{7x^2} = \frac{2}{7} \quad \times \quad : 1$$

گزینه ۴ ۶۸۲

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^n + 3x - 1}{2x^3 - x + 5} = 4$$

با توجه به این که حاصل حد، عددی حقیقی غیر صفر شده است، بنابراین بایستی درجه صورت و مخرج یکسان باشند، پس بایستی $n = 3$ باشد، حال حاصل حد را محاسبه

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^3 + 3x - 1}{2x^3 - x + 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^3}{2x^3} = \frac{a}{2} = 4 \Rightarrow a = 8$$

$$an = 8 \times 3 = 24$$

بنابراین:

گزینه ۱ ۶۸۳

$$f(x) = \frac{2x+5}{x^2-4x+3} \text{ و } g(x) = 2^x$$

ابتدا حاصل $f(x)$ وقتی $x \rightarrow 1^+$ را محاسبه می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x+5}{x^2-4x+3} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x+5}{(x-1)(x-3)} = \frac{7}{0^+ \times (-2)}$$

$$= \frac{7}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(f(x)) = g(-\infty) = 2^{-\infty} = \left(\frac{1}{2}\right)^{+\infty} = 0$$

بنابراین:

گزینه ۱ ۶۸۴

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2^{\frac{1}{x}} = 2^{0^-} = 2^{-\infty} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(f(x)) = g(0) = \frac{2(0)-3}{(0)+1} = -3$$

بنابراین:

گزینه ۴ ۶۸۵

$$|x^2 - 4| = x^2 - 4 \text{ ، پس: } x \rightarrow \infty \text{ با توجه به این که } x \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 4}{ax^2 - x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{ax^2} = \frac{1}{a} = -1 \Rightarrow a = -1$$

حال با توجه به مقدار به دست آمده برای a ، حاصل $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x)$ را به دست می‌آوریم:

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{|x^2 - 4|}{-x^2 - x + 2} = \lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{4 - x^2}{-x^2 - x + 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)(x-1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{x-2}{x-1} = \frac{-4}{-3} = \frac{4}{3}$$

گزینه ۴ ۶۸۶

$$f(x) = \frac{ax^n - 3x + 1}{3x^3 + x}$$

با توجه به این که حاصل حد یک عدد حقیقی غیر صفر می‌باشد، بنابراین بایستی درجه صورت و مخرج یکسان باشد، پس $n = 2$ می‌باشد.

حال با توجه به $n = 2$ ، مقدار a را محاسبه می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2 - 3x + 1}{3x^3 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2}{3x^3} = \frac{a}{3} = \frac{2}{3} \Rightarrow a = 2$$

بنابراین $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{3x^3 + x}$ می‌باشد، پس $f(-1)$ برابر است با:

$$f(-1) = \frac{2(-1)^2 - 3(-1) + 1}{3(-1)^3 + (-1)} = \frac{2+3+1}{-3-1} = \frac{6}{-4} = -\frac{3}{2}$$

گزینه ۲ ۶۸۷

$$f(x) = \frac{ax + \sqrt{4x^2 + 5}}{2x + 2}$$

جمله با بزرگترین درجه در عبارت $\sqrt{4x^2 + 5}$ برابر است با:

$$\sqrt{4x^2 + 5} \sim \sqrt{4x^2} \sim |2x|$$

بنابراین حاصل حد برابر است با:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax + |2x|}{2x + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax + 2x}{2x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a+2)x}{2x + 2}$$

$$= \frac{(a+2)x}{2x} = \frac{a+2}{2} \text{ پس } \frac{a+2}{2} = \frac{5}{2} \text{ می‌باشد:}$$

$$\frac{a+2}{2} = \frac{5}{2} \Rightarrow a+2 = 5 \Rightarrow a = 3$$

با توجه به مقدار $a = 3$ ، $f(x) = \frac{3x + \sqrt{4x^2 + 5}}{2x + 2}$ می‌باشد.

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{3(-1) + \sqrt{4(-1)^2 + 5}}{2(-1) + 2} = \frac{0}{0} \Rightarrow \text{باید رفع ابهام شود}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x + \sqrt{4x^2 + 5}}{2x + 2} \times \frac{3x - \sqrt{4x^2 + 5}}{3x - \sqrt{4x^2 + 5}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{9x^2 - 4x^2 - 5}{-6(2x + 2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{5(x-1)(x+1)}{-12(x+1)} = \frac{5}{-6}$$

گزینه ۲ ۶۸۸ ابتدا $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{x}\right]$ را به دست می‌آوریم:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{x}\right] = \left[\frac{1}{-\infty}\right] = [0^-] = -1$$

بنابراین حاصل حد به صورت زیر است:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left[\frac{1}{x}\right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \times -1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} -x = -(-\infty) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 \Rightarrow L = -1 \text{ با توجه به شکل: } \text{گزینه ۲ ۶۸۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty \text{ بنابراین:}$$

گزینه ۲ ۶۹۰

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + a}{x^2 + bx + 1}$$

با توجه به شکل، تابع بر محور x مماس است، پس تابع f تنها یک ریشه دارد، یعنی صورت کسر ریشه مضاعف دارد.

$$\Delta_{\text{صورت}} = 0 \Rightarrow (-2)^2 - 4(1)(a) = 0 \Rightarrow a = 1$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + bx + 1}$$

حال با توجه به نمودار تابع در اطراف مجانب قائم بایستی مخرج کسر ریشه مضاعف داشته باشد (تا در اطراف ریشه تغییر علامت نداشته باشیم).

$$\Rightarrow \Delta_{\text{مخرج}} = 0 \Rightarrow (b)^2 - 4(1)(1) = 0 \Rightarrow b^2 = 4 \Rightarrow \begin{cases} b = 2 \\ b = -2 \end{cases}$$

حال با توجه به شکل ریشه مضاعف باید منفی باشد، بنابراین $b = +2$ قابل قبول می‌باشد.

$$\Rightarrow a + b = 1 + 2 = 3$$

گزینه ۱ ۶۹۱ ابتدا مقدار $g(x)$ را وقتی $x \rightarrow +\infty$ میل می‌کند، به

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}} \text{ دست می‌آوریم:}$$